Бледная трепонема не щадит никого

История болезни

- Глупо все получилось… Даже не знаю, что рассказывать… Собрались с друзьями, выпили пива, мало показалось, добавили покрепче… Откуда она в компании взялась не помню, звали ее вроде Лена… Что-то говорила, смеялась… Помню пил с ней на брудершафт… Не знаю, как оказался с ней в машине друга, там все и произошло, резинки с собой не было… Через неделю уже и забыл все, вдруг язвочка появилась… Думал пройдет, пустяки, а она все больше и больше… Страшно стало … Что жене говорить не знаю, я, скорее всего ее тоже заразил… А дочка, господи…

- Мы обязаны проверить все ваши контакты: и в семье, и на стороне. Лену эту найти сможете?

- Да я, даже лица ее не помню! Нашел бы, убил…

В 2010 году в округе было зарегистрировано 5 случаев заболевания сифилисом.

Сифилис - хроническое венерическое заболевание, возбудителем которого является микроб под названием - спирохета (бледная трепонема). Этот недуг является инфекционным заболеванием, которое передается через половой контакт с больным, либо от матери к малышу, либо в следствии близкого бытового контакта.Сифилис может делиться на несколько периодов, с облегчением и ухудшением состояния болезни. Во время протеканиям заболевания, во всех органах человеческого организма возникают очаги воспаления. На последних стадиях развития, сифилис может стать причиной повреждения центральной нервной системы, а так же многих внутренних органов. Например: сердца, печени, почек. Болезнь начинается внезапно, в скором времени после заражения. Но, существуют случаи, когда первые признаки заражения сифилисом могут возникнуть через сравнительно долгий промежуток времени. В некоторых случаях, может возникнуть через десятки лет после заражения. Так - же не стоит забывать, что наличие внешних признаков заражения на каких либо органах, в частности половых, может отсутствовать.

В 2012 году их было уже 11. Пусть никого не смущает скромная цифра: это только те, кто обратился в Арамильскую городскую больницу. Немалая часть заболевших едет в Екатеринбург, в частные клиники, в анонимные кабинеты. -Что особенно тревожит, - говорит врач-дерматовенеролог Арамильской городской больницы Дарья Родионова, - так это увеличение обращений на поздних стадиях заболевания. Люди не обращают внимания на явные симптомы заболевания. Болезнь переходит в более тяжелую стадию, а значит и лечение проходит сложнее.

При выявлении больного приходится обследовать всех, с кем он контактировал, ведь сифилис передается не только половым путем, но и бытовым. Кроме того, с больного берется расписка о том, что он должен информировать о своем заболевании человека, с которым собирается вступить в половой контакт. Если он этого не сделает, ему грозит уголовная ответственность.

История болезни

-Это была моя первая девушка, до нее у меня никого не было. Поэтому я даже не сомневаюсь, что она меня заразила. А так все хорошо начиналось: встречи, любовь… Сейчас она клянется, что ничего не знала и не подозревала, что у нее сифилис. Я не верю, бросил ее сразу же… Прошел курс лечения, а через 3 месяца появились пятна на руках и ногах, шелушатся, на губах покраснения. Неужели опять началось?!



Главная причина роста заболеваемости – увеличение обследования населения. Именно во время обследований выявляется большая часть случаев болезни. Чаще всего это обследования для получения

Гонорея - инфекционное заболевание, вызываемое гонококками и передаваемое половым путём.

Пути заражения: чаще половой, реже бытовой (через предметы личной гигиены). Новорождённые заражаются при прохождении через родовые пути больной матери. Инкубационный период от 1 дня до 1 месяца (в среднем 2-5 дней).

Гонорея поражает мочеполовые органы, уретру, шейку матки, нижнюю треть прямой кишки, конъюнктиву. У мужчин инкубационный период течения гонореи длится 2-15 суток. Первые симптомы гонореи появляются через 2-5 дней после контактас больным партнером. Сначала у больного гонореей ощущается дискомфорт в мочеиспускательном канале, через несколько часов появляются зуд, жжение и гнойные выделения желтовато - зеленого цвета.

У женщин инкубационный период течения гонореи длится 1-3 недели и обычно протекает бессимптомно. Большой процент бессимптомного течения гонореи у женщин приводит к редкой выявляемости заболевания на ранних стадиях заболевания.

санитарной книжки. Большой процент роста дают и мигранты, которых обязали проходить медкомиссию в том числе сдавать анализы на наличие венерических заболеваний.

У женщин сифилис часто выявляется при постановке на учет по беременности. Иногда женщины становятся на учет поздно, когда болезнь переходит в запущенную форму. Тогда возможны случаи врожденного сифилиса. Лечение этой болезни рекомендовано до 24 недель, а беременные порой встают на учет после 25 недель. Но до сих пор, ни одного такого случая в Ара мили не было.

История болезни

- Два года встречалась с женатым… Обещал, что разведется с женой, но так и не развелся… Расстались… Я переживала, потом встретила своего будущего мужа, мы встречались всего месяц, потом поженились… Я забеременела, мы оба были просто счастливы, пошла вставать на учет, сдала анализы… Через неделю мне позвонили, предложили прийти к дерматовенерологу, оказалось, что анализ на сифилис дал положительный результат, проверили мужа – реакция Вассермана положительная… Ругались, обвиняли друг друга… Потом выяснилось, что у меня более запущенная стадия – три креста, а у его всего один, значит я его заразила… Это мне женатик мой подарил… Что делать не знаю? Аборт? А вдруг потом детей не будет никогда, ведь это моя первая беременность… муж вроде простил или делает вид, что простил… врачи успокаивают, что последствий почти не будет… но стопроцентной уверенности у них нет…

А вот заболеваемость гонореи идет на убыль. В 2010 зарегистрировано 10 человек, в 2011 – 8, в 2012 – 4. Конечно, свою роль в этом сыграло и повышение санитарной грамотности населения, почти поголовное использование презервативов. А вот число заболевших трихомониазом

снизилось вдвое по причине свободной продажи препаратов, излечивающих это заболевание.

-С одной стороны это хорошо, - говорит Дарья Родионова, - а с другой – плохо. Заразившиеся руководствуются не рекомендациями врачей, а рекламой. Это приводит к недолечиванию, к тому, что инфекция приобретает скрытые формы. Кроме этого, гонорея и трихомониаз в половине случаев возвращаются. Граждане лечатся самостоятельно, врачам об этом не говорят, приходят в больницу, сдают мазок, который показывает, что они здоровы. А через две недели снова бегут к нам, потому что все симптомы болезни вернулись, и приходится все начинать снова. Если же гонорея переходит в скрытую форму, то начинаются хронические нарушения в тазовых органах.

В перечень заболеваний, передающихся половым путем, микроспория и чесотка не входят. Однако от человека к человеку передаются при тесном контакте, как и венерические болезни.

Микроспория или стригущий лишай, передается человеку от кошек. В 2010 году зафиксировано 2 случая заболевания, в 2011 – 23, в 2012 – 16. Здесь все просто – погладил кошечку, и привет. Все заболевшие – дети. Оперативно выявляют их медработники в школах, поэтому число заболеваний снижается.

Заболеваемость чесоткой тоже снижается.

В 2012 году зарегистрировано всего трое заболевших. Снижение объясняется тем, что чесоточные едут в кожно-венерологический диспансер Екатеринбурга. В Арамили на учет они не встают, стесняются своей болезни.

До недавнего времени лечение венерологических заболеваний оплачивалось средствами бюджета. При выявлении заболевания инъекции ставились сразу же в смотровом кабинете. Сейчас лекарства больной должен покупать за свой счет. Но бесплатно, все же можно вылечиться, если лечь в стационар.

Кстати, реформа здравоохранения привела к тому, что венерологическое отделение

Трихомониаз. — является наиболее распространенной инфекцией в мире, передающейся половым путем. По данным ВОЗ, трихомонадой заражены более 170 миллионов человек (реальные цифры больных может быть намного выше). Распространенность трихомониаза в группе взрослого населения в развивающихся странах достигает более 40%.

Передача трихомонады преимущественно происходит при половых контактах. Но возможны передача трихомонады контактным путем, через полотенца, нижнее белье, при несоблюдении правил личной гигиены. Трихомониаз вызывает поражения и у мужчин, и у женщин. Клинически проявляется чаще у женщин. У мужчин зачастую протекает без симптомов. Симптомы трихомониаза у мужчин наиболее часто проявляются жжением во время мочеиспускания, после и во время полового контакта. Трихомонадная инфекция у мужчин, как правило, поражает предстательную железу и вызывает хронический простатит.Симптомы трихомониаза у женщин часто отсутствуют, но могут быть зелено-желтые выделения (могут быть пенистые с неприятным запахом, при половых контактах неприятные ощущение и при мочеиспускании дискомфорт)

НИИ дерматологии Свердловской области по решению Минздрава в прошлом году было закрыто. На сегодняшний день ни одного такого отделения нет. Венерические больные лечатся на общих основаниях в инфекционных отделениях, беременные с сифилисом лежат в гинекологии.

- Я считаю, что ничего постыдного в этом в венерическом заболевании нет, - говорит Дарья Родионова, - зря люди стесняются его. Заболеть им может любой. Как директор крупного предприятия, так и уборщица. Все в равной степени. Почти все заболевания, передающиеся половым путем, могут протекать бессимптомно, поэтому я рекомендую всем, хотя бы раз в полгода проходить обследование либо у меня, либо у гинеколога. Но здесь необходимо помнить, что если незащищенный половой акт произошел вчера, то анализы ничего не покажут, так как инфекция еще не внедрилась. Должно пройти, как минимум, две недели.

Недавно при кабинете дерматовенеролога открылась смотровая. Здесь проводится осмотр женщин с целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Не секрет, что количество этих болезней с каждым годом увеличивается, и единственный способ борьбы с ними своевременное обнаружение.

Лариса Ушакова